RICORDATEVI DI:

- 1- Completare scrupolosamente la preparazione intestinale (vedi istruzioni allegate)
- 2- Essere a digiuno dalla mezzanotte **NON ASSUMERE NE SOLIDI NE LIQUIDI**.
- 3- Continuare ad assumere le terapie in corso (farmaci per il cuore, pressione, respiro). Se si prende al mattino è consentito un piccolo sorso d'acqua.
- 4- Essere accompagnati da qualcuno.
- 5- Portare con Voi l'impegnativa del Medico Curante, tessera sanitaria ed eventuali esenzioni, eventuale documentazione clinica e radiologica (ecotomografie, TC, RMN) oltre ai referti di precedenti colonscopie.

IMPORTANTE:

Terapia anticoagulante

sospendere per tempo l'assunzione di farmaci anticoagulanti (**Sintrom[®], Coumadin[®]**): il paziente deve rivolgersi al Centro di Riferimento o al Medico di Medicina Generale per la sospensione di tale terapia (che dovrà avvenire almeno 5 giorni prima dell'esame) e per la prescrizione della terapia eparinica sostitutiva. L'ultima dose di eparina potrà essere assunta al massimo 8 ore prima della procedura endoscopica. Il paziente dovrà presentarsi il giorno dell'esame munito della risposta degli esami del sangue con i valori di PT e INR (< 1,5), eseguiti 24 – 48 ore prima dell'esame.

Anticoagulanti di nuova generazione “NOACs” (**Xarelto[®], Eliquis[®], Pradaxa[®]**)

- vanno sospesi 24/48 ore prima in base al tipo di farmaco e per esami a basso rischio di sanguinamento (EGDS o EGDS + biopsia) e comunque in accordo con il Medico di Medicina Generale.
- Vanno sospesi dalle 48/96 ore prima per gli esami operativi ad alto rischio di sanguinamento (COLONSCOPIE CON BIO, COLONSCOPIE CON POLIPECTOMIE)

Terapia antiaggregante

- acido acetilsalicilico (Aspirina[®], Aspirinetta[®], Cardioaspirin[®], Cardirene[®], Ascriptin[®]) la terapia non va sospesa
- ticlopidina (Tiklid[®], Clopidorel (Plavix[®]), Prasugrel (Efient[®]), Ticagrelor (Brilique[®])): la terapia va sospesa 7 giorni prima dell'esame endoscopico.

Doppia antiaggregazione

- Acido Acetilsalicilico + Ticlopidina o Clopidogrel o Prasugrel o Ticagrelor: vanno sospesi previo accordo con il Cardiologo curante.
-