



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto IRCCS
Presidio Ospedaliero S. Giacomo di Castelfranco Veneto
e-mail: medicinanucleare.cfv@iov.veneto.it – tel. 0423-421341

PREPARAZIONE PER: SCINTIGRAFIA TIROIDEA E SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI

- Non è necessario il digiuno
- Il paziente non deve aver eseguito esami Radiologici con mezzi di contrasto negli ultimi 2 mesi
- Il paziente deve sospendere almeno 15 giorni prima dell'esame l'assunzione o l'utilizzo di:
 - Sale iodato
 - Dentifrici iodati (Iodosan, ecc.)
 - Collutori iodati (Iodosan coll.)
 - Disinfettanti a base di Iodio (Es. Tintura di iodio, Betadine, ecc.)
 - Prodotti erboristici contenenti Iodio (Alghe marine, prodotti anticellulite es. Somatoline)
 - Prodotti erboristici naturali a base di estratto secco di tiroide

- È necessaria la sospensione dei seguenti farmaci se assunti in terapia:
 - TAPAZOLE, BROMAZOLO, CINETIC, PERTIROID, TIROIDE AMSA, TIROIDE VISTER, PROPICIL (7 GIORNI PRIMA DELL'ESAME)

 - EUTIROX, TIRACRIN, TIROSINT (40 GIORNI PRIMA DELL'ESAME)

 - CORDARONE, AMIODAR, AMIODARONE (6-8 MESI PRIMA DELL'ESAME)

NB: LA SOSPENSIONE PUO' ESSERE ESEGUITA SOLO DOPO CONSULTAZIONE CON MEDICO CURANTE O MEDICO SPECIALISTA ENDOCRINOLOGO. NEL CASO IL MEDICO CURANTE NON CONSIGLI LA SOSPENSIONE CONTATTARE IL MEDICO NUCLEARE.