
	<b>ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S.</b>  <b>UOC MEDICINA NUCLEARE</b> E-mail sede Padova: <a href="mailto:medicina.nucleare@iov.veneto.it">medicina.nucleare@iov.veneto.it</a> Tel. Segreteria sede di Padova: 049-8211729 (h.10-13) E-mail sede Castelfranco V.to: <a href="mailto:medicinanucleare.cfv@iov.veneto.it">medicinanucleare.cfv@iov.veneto.it</a> Tel. Segreteria sede di Castelfranco V.to: 0423-421341 (h.9-13)	 REGIONE DEL VENETO
--	---	---

## TERAPIA RADIOMETABOLICA CON IODIO 131

### INFORMAZIONI E ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE

#### TEMPI DI SOSPENSIONE PER ALCUNI FARMACI O PRODOTTI

FARMACO O PRODOTTO	SOSPENSIONE CONSIGLIATA
Multivitaminici contenenti Iodio	7 giorni
Ormoni tiroidei (Eutirox, Tirosint, Liotir), dentifrici, collutori, caramelle disinfettanti della bocca/cavo orale, disinfettanti, espettoranti, lavande/ovuli vaginali, tinture per capelli (in particolare sfumature rosse), prodotti a base di alghe marine, prodotti a scopo dimagrante o estetico contenenti iodio o ormoni tiroidei (Somatoline), soluzione di Lugol, Rubjovit	2 - 3 settimane in base al contenuto di iodio
Tintura di Iodio (Betadine)	2 - 3 settimane
Mezzi di contrasto idrosolubili	3 - 4 settimane (in caso di funzionalità renale normale)
Mezzi di contrasto liposolubili (oggi utilizzati di rado)	Circa 3 mesi
Farmaci antidiarroici (Mexaform) e antiaritmici (in particolare Cordarone e Amiodarone)	3 - 6 mesi o più